

Apartir de sua descoberta, no inicío da decada de 80, a AIDS tem sido responsável por milhares e milhares de mortes no mundo.

Atualmente são mais de 36 milhões de pessoas infectados pelo vírus da Aids, sendo que nem todos desenvolveram a doença ainda.

Até hoje a ciência não descobriu a tão sonhada cura da doença e nem uma maneira segura de impedir seu desenvolvimento.

Por tanto o mais seguro é:

- Só transe com camisinha
- Não compartilhe agulhas e seringas com ninguém.
- Não entre em contato com materiais sujos de sangue.
- * Portanto você dona de casa converse, pergunte, tire suas dúvidas.

Lembre-se que a informação e a prevenção continuam sendo as melhores armas contra a AIDS.



270

IOPEM

Instituto de Orientação e Prevenção as DST/AIDS para Mulheres de Baixa Renda.

Rua: Capitão Uruguai, 290 - Fortaleza - Ce. Aerolândia - CEP: 60851.100 Fone (85) 257.7292 - 272.6655

Elaborado por

- * Silvia Rejane Canário Xavier
- * Regina Maria Teixeira
- * Rosarina Sampaio
- * Lívia Horácio



O Instituto de Orientação e Prevenção as DST/AIDS para Mulheres de Baixa Renda - IOPEM fundado no dia 23 de Junho de 1999 é uma entidade sem fins lucrativos que há 02 anos desenvolve atividades Educativas e Preventivas sobre - prevenção as DST/AIDS, Sexualidade, Relações Sociais de Gênero, Saúde Reprodutiva, Sexo mais seguro, Autoestima valorização da vida para Mulheres de Baixa Renda.

E mantém parcerias com unidades de Saúde, onde incentivamos e encaminhamos as mulheres para fazer a prevenção do câncer de colo de últero e mama, tratamento de DST'S, realização de Pré-natal e planejamento familiar.

Nosso objetivo maior atraves de nossas ações é buscar melhoria na qualidade de vida dessas mulheres e seus familiares.



DST'S - Doenças Sexualmente Transmissíveis ou seja, pega-se mantendo relações sexuais sem camisinha com alguém infectado.

GONORRÉIA







corrimento na vagina
dor nas relações
sexuais e ao urinar

corrimento no pênis
 dor aor urinar

· corrimento no ânus

27000

Sintomas:

Corrimento amarelado e esverdeado as vezes com sangue, dor e ardência ao urinar.

Importante:

No Homem a gonorréia é fácil de ser percebida a maioria das mulheres não apresentam sintomas.

Apresenta corrimento vaginal sem cheiro e coçeira.

SÍFILIS







Na vagina

· No pênis

No ânus

Sintomas:

Feridas sem dor nos órgãos genitais, surge de duas a três semanas após a relação sexual (vaginal, oral ou anal) manchas em várias partes do corpo.

TRICOMANIASE

Sintomas:

Corrimento abundante amarelado ou esverdeado, mal cheiro, coceira ou iritação da vagina.

CANDIDÍASE VAGINAL

Sintomas:

Corrimento vaginal de cor branca, coceira na região vaginal ardor ao urinar e durante o ato sexual.

CANCRO MOLE

Sintomas:

Feridas pequenas dolorosas e c<mark>om pus aparecem de 2 a 5</mark> dias após a relação sexual.

LITOGRANULOMA VENÉREO

Sintomas:

Feridas pequenas nos órgãos genitais, às vezes nos órgãos genitais, às vezes não percebidas. Caroços nas virilhas que se rompem com eliminação de pus, de 7 a 30 dias após o contágio. O ânus pode ser atingido febre e dor muscular.

HERPES GENITAIS

Sintomas:

Pequenas bolhas na vagina, pênis, ân<mark>us e outras partes do</mark> corpo, com ardor e coceira.

CONDILOMA ACUMINADO







Na vulva

No pênis

No ânus

Sintomas:

Verrugas isoladas ou em grupo nos orgãos genitais e ou ânus.

Importante:

Se for tratado, o codiloma é fácil de curar, mas se não for tratado, vai aumentar e terá que ser retirado com cirurgia. Pode ocasionar câncer de colo de útero ou no pênis.



...que todas estamos expostas a contrair o vírus. ...que a AIDS é a primeira causa de morte em mulheres de 25 a 39 anos de idade.

... que muitas mulheres estão sendo infectadas pelos próprios maridos. ...que o HIV é o vírus que causa a AIDS,





Se você...



então você corre o risco de se infectar com o vírus HIV.



280



PREFEITURA DE MACAE

Prefeitura Municipal de Macaé Secretaria Municipal de Saúde Programa Municipal DST/AIDS CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento Rua do Sacramento, 222 . Imbetiba Macaé . RJ Tel. (24) 772 9397 CN - DST/AIDS-MS



- Não existe "grupo de risco". O vírus pode passar para qualquer pessoa, homens ou mulheres. Não importa com quem você transe.
- A camisinha feminina é uma boa alternativa de prevenção, pois também evita a Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.
- Só dá para saber se uma pessoa está contaminada se ela fizer o teste específico para Aids. Ele pode ser feito de graça nos Centros de Testagem Anônima, nos Postos de Saúde e Hospitais Públicos. As mulheres grávidas devem fazer o teste no pré-natal.
- Hoje em dia é possível viver bem com Aids, com o tratamento adequado.
- Existem muitos grupos de apoio organizados, onde se pode buscar informação e solidariedade.

















Grupo Pela Vidda/RJ

Av. Rio Branco, 135 sl. 709 Centro - RJ - Cep 20040-006 Tel.: (21) 518.3993 Fax: (21) 518.1997 E-mail: gpvrj@pelavidda.org.br www.pelavidda.org.br

• Serviços úteis
Disque Aids Pela Vidda:
(21) 518.2221
Disque Aids Virtual:
disqueaids@pelavidda.org.br
Pergunte Aids: 0800 61-1997
Disque Aids do Centro de Testagem:
(21) 293.2255

• Hospitais de Referência Universitário Clementino Fraga Filho (Fundão) Av. Brigadeiro Trompowski s/nº -Ilha do Governador Tel.: (21) 590.5252 ramal 500

Universitário Gafreé e Guinle Rua Mariz e Barros, 775 - Tijuca Tel.: (21) 568.4244 e 569.6792

Universitário Pedro Ernesto (UERJ) Av. 28 de Setembro, 87 - Vila Isabel Tel.: (21) 587.6100

Universitário Antônio Pedro Rua Marquês do Paraná, 303 - Niterói Tel.: (21) 620.2828

Hospital dos Servidores do Estado Rua Sacadura Cabral, 178 - Saúde Tel.: (21) 291.3131

Hospital Azevedo Lima Rua Teixeira de Freitas, 30 - Niterôi Tel.: (21) 627.2626

Postos de Saúde
 Centro Previdenciário de Niterói
 Rua Desembargador Athayde
 Parreiras, 226 - Bairro de Fátima
 Tel.: (21) 717.0088

PAM 13 de Maio

Rua Treze de Maio, 23 sl. 1536 - Centro Tel.: (21) 282.1334 ramal 150

Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira Rua Silveira Martins, 161 - Catete Tel.: (21) 225,3864

Centro de Saúde João Barros Barreto - Rua Toneleros, 262 -Copacabana - Tel.: (21) 256.2202

Centros de Testagem
 Madureira
 Av. Edgard Romero, 278
 Tel.: (21) 390.0180 ramal 225

Rocha Maia (Botafogo) Rua General Severiano, 91 Tel.: (21) 295.2295

São Francisco (Centro) Av. Presidente Vargas, 2863 Tel.: (21) 293.9443

Santa Rosa (Niterói) Praça Vital Brasil s/nº Tel.: (21) 711.2366

Edição e Revisão

Gráfica Cervantes

Target Assessoria de Comunicação Ltda. Projeto gráfico Renata Figueiredo Fotolitos Rainer Impressão

Tiragem
4.000 exemplares - Junho 2001
Apoio:
ICCO

Fundação MacArthur

COLABORE COM OS PROJETOS DO **GRUPO PELA VIDDA/RJ** CONTA-DOAÇÃO: BRADESCO -AGÊNCIA 1444-3 - C/C 11205-4



AIDS VOCÊ PODE EVITAR













pela WIDDA









A Aids pode provocar graves problemas de saúde, diminuindo a capacidade de defesa do nosso organismo contra diversas doenças. A Aids ainda não tem cura, mas tem tratamento.



O que causa a Aids?

Um vírus chamado HIV, que pode passar de uma pessoa para outra.



- 1• Em qualquer tipo de relação sexual (vaginal, anal e oral), através do líquido vaginal, do esperma (gozo) ou do sangue contaminados.
- 2. Pelo sangue contaminado, através de transfusão ou uso de seringas e agulhas contaminadas.
- 3• Da mãe contaminada para o filho: durante a gravidez, durante o parto ou pelo leite materno.



- Usando o preservativo (camisinha) corretamente em todas as relações sexuais.
- 2. Usando agulhas e seringas descartáveis.
- 3. Só aceitando transfusão de sangue testado para Aids.
- 4. A gestante soropositiva pode, com o tratamento adequado, reduzir o risco de transmissão para o bebê.



Não se pega Aids por:

- Abraços, beijos, carícias ou aperto de mão.
- Vasos sanitários, copos, talheres, roupas ou sabonetes.
- Saliva, lágrima ou suor.
- Picadas de mosquito, animais, piscina ou praia.
- · Tosse, espirro ou pelo ar.
- No assento do ônibus, cadeiras, bancos públicos de praças, parques ou hospitais.
- Alimentos.
- Doação de sangue com material descartável.











Para a camisinha não arrebentar é importante:

- Olhar o prazo de validade;
- Abrir a embalagem só na hora de usar;
- Não usar lubrificante oleoso (manteiga, óleo, vaselina etc.);
- Só usar lubrificante à base de água (KY, Preservgel, glicerina líquida etc.);
- Colocar a camisinha com o pênis já duro;
- Apertar a ponta da camisinha antes de desenrolar;
- Desenrolar até a base do pênis;
- Tirar a camisinha logo depois da ejaculação (gozo), com o pênis ainda duro;
- Usar uma camisinha nova para cada relação.















DICAS E SERVIÇOS

Informações sobre Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis

Disque-Aids: (ligação gratuita) 0800 61 1997 ou 0800 16 2550

Orientação, realização de exame anti-HIV e encaminhamento para consulta médica em São Paulo

COA-Henfil

Rua Libero Badaró, 144, Centro (Metrô Anhangabaú) Tel: 239-2224 De 2ª a 5ª feira, das 9:30 às 15:30 hs.

COA-CRT

Rua Santa Cruz, 81 (Metrô Santa Cruz) Tel: 570-9911 De 2ª a 6ª feira, das 14 às 19 hs.

Apoio e convivência

Grupo Pela Vidda/SP R. General Jardim, 566. Tel: 258-7729

Cha Positivo: 5ª feira às 19:30 hs www.aids.org.br

Contra a violência

Ligue 190 ou para o "Disque-Denúncia", que recebe denúncias sobre crimes e violência em São Paulo durante 24 horas, todos os dias, por meio de ligações gratuitas para o telefone 0800-156315.

Comissões de Direitos Humanos

Câmara Municipal de São Paulo Tels.:(11) 3111-2000/3111-2023 Assembléia Legislativa de São Paulo Tels.: (11) 3886-6301/3884-3986



O SÉXO ORAL DO PÊNIS (BOQUETE) SEM CAMISINHA PODE TRANSMITIR O HIV E OUTRAS INFECÇÕES, PRINCIPALMENTE SE EXISTIR SANGRAMENTO NA GENGIVA, OU FERIMENTO NA BOCA OU NO PÊNIS.



(AS GOTAS QUE SAEM ANTES DA EJACULAÇÃO), DEIXAR GOZAR NA BOCA OU ENGOLIR A PORRA SÃO PRÁTICAS ARRISCADAS.


> ALÉM DA AIDS, EXISTEM MUITAS DOENÇAS TRANSMITIDAS NAS RELAÇÕES SEXUAIS DESPROTEGIDAS.

> > É O CASO DA SÍFILIS, GONORRÉIA, HERPES, CANCRO MOLE, CRISTA DE GALO E TRICOMONAS.

JÁ O SEXO ORAL DO ÂNUS (CUNETE)
TRAZ MENOS RISCOS EM RELAÇÃO AO HIV,
MAS PODE SER A PORTA DE ENTRADA PARA
SÍFILIS, HEPATITE E OUTRAS DOENÇAS.

PROCURE LOGO UM SERVIÇO DE SAÚDE SE APARECER FERIDA, VERRUGA, CORRIMENTO, ARDÊNCIA OU COCEIRA, SEJA NO PÊNIS OU NO ÂNUS.

ALÉM DO DESCONFORTO E DA DOR, ESSAS DOENÇAS PODEM AUMENTAR EM MUITAS VEZES O RISCO DE TRANSMISSÃO DO HIV. SÓ TIRE A CAMISINHA DA EMBALAGEM NA HORA DE USÁ-LA. APERTE A PONTA PARA SAIR TODO O AR. É AÍ ONDE O ESPERMA VAI SE ALOJAR NA HORA DA EJACULAÇÃO.



NA HORA DA PENETRAÇÃO, SE POSSÍVEL, SU USE TAMBÉM GEL LUBRIFICANTE, À BASEDE ÁGUA.

NÃO USE VASELINA, ÓLEO MINERAL OU OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.




A TRANSA FICARÁ MAIS GOSTOSA E SEGURA.

2













Créditos

Projeto

Este material integra o projeto de Prevenção Profissionais da Noite do Grupo Pela Vidda/SP, realizado na região central da cidade de São Paulo. Coordenação: Renato de Paula Marin

Texto e roteiro

Ilustração

I.Man

Diagramação José Humberto de Souza Santos

Agradecimentos

Camila Barone, Fedra de Córdoba e Nana Voguel (voluntárias do Pela Vidda/SP)

Fontes

Estrela da Noite faz referências e presta homenagem ao pioneiro projeto Previna, do ISER/RJ ,que produziu em 1989 a primeira campanha de prevenção dirigida a travestis. Também utilizamos como fonte materiais informativos dos grupos GGB e Nuances.

Financiamento

CNDST/AIDS do Ministério da Saúde e UNDCP -Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas.

Parceria



R. General Jardim, 566. Tel: (11) 258-7729 e-mail: gpvsp@uol.com.br home-page: www.aids.org.br

* Reprodução autorizada, desde que previamente comunicada ao Pela Vidda.

Como usar:

Para colocar a camisinha, encontre uma posição confortável. Pode ser em pé com o outro pé em cima de uma cadeira; sentada com os joelhos afastados; agachada ou deitada.



Abra a embalagem, segure a argola interna conforme a figura.



Aperte a argola interna e a introduza na vagina, com o dedo indicador.



Empurre-a com o dedo até sentir o colo do útero.



A camisinha feminina deve cobrir o
colo do útero e
recobrir a vagina. A
argola externa fica
para fora da vagina
e isso aumenta a
proteção.



Terminada a relação, retire a camisinha dando uma
"torcida" na argola
externa, para que o
esperma não escorra, puxando-a com
cuidado e jogandoa na lixeira.



Grupo selection (CD)

Rua 19 d° 35 Tórreo • Edificio Dum Abel • Centro CEP: 74036-901 • Foné: (082) 412-7178 das 11:90 às 19:00 hs. Teletax: (012) 212-5219





www.aids.gov.br





CHEGOU A CAMISINHA DA MULHER





Porque amar envolve proteção.

Agora as mulheres têm mais uma opção para se proteger contra a gravidez indesejada, as doenças sexualmente transmissíveis e a aids: a camisinha feminina.

Em geral, as mulheres não conseguem conversar sobre sexo, desejo, medos e inseguranças com seus parceiros, e ainda têm dificuldade de negociar o uso da camisinha masculina.

A camisinha feminina, criada como alternativa de prevenção, além de proteger, facilita o diálogo com seu parceiro, porque dá maior autonomia à mulher sobre seu corpo e sua vida sexual. Ao contrário da camisinha masculina que só pode ser colocada com o pênis duro, a camisinha feminina pode ser colocada até 8 (oito) horas antes da relação sexual.

Agora, no jogo do amor e do prazer, você, mulher, pode dar as cartas. Você vai se sentir mais segura e protegida. Conheça e experimente a camisinha feminina!

- Nunca use a camisinha feminina junto com a masculina.
- A camisinha feminina é descartável, ela tem de ser jogada fora após cada relação sexual.
- Se você deseja conhecer e experimentar a camisinha feminina, procure a Coordenação de DST e Aids do seu estado ou ligue para o Disque Saúde e informe-se sobre os serviços onde ela está disponível gratuitamente,

Disque Saúde: 0800 61-1997

Não existe grupo de risco, e sim comportamento de risco, converse isso com sua família e amigos. Previna-se sempre.

Como usar a camisinha masculina:



Coloque sempre a camisinha antes do início da relação sexual. Coloque a camisinha quando o pênis estiver duro.

Não deixe a camisinha apertada na ponta do pênis. Deixe um espaço vasio (2cm) na ponta da camisinha; ele vai servir de depósito de esperma.

Aperte o bico da camisinha até sair todo o ar. Cuidado para não apertar com muita força, para não estragar a camisinha.



Encaixe a camisinha na ponta do pênis, sem deixar o ar entrar. Vá desenrolando até que ele fique todo coberto. Se ela não ficar bem encaixada ou se ficar ar dentro, a camisinha pode rasgar.



Não se deve passar nada na camisinha. Se quiser que ela fique lisa na penetração, use as já lubrificadas. Em último caso, use apenas lubrificantes feitos à base



Depois de gozar, retire o pênis enquanto estiver duro. Quando o pênis comeca a amolecer, a camisinha fica frouxa, permitindo que o esperma escape pela parte de cima.



Retire a camisinha com cuidado: não deixe que ela escorregue, nem que o líquido seja derramado. Depois de retirada a camisinha, embrulhe em papel higiênico e jogue no lixo.

A fidelidade mútua, o respeito ao parceiro e o amor ainda são doses certas de prevenção. Converse sobre este assunto e cultive isso no seu relacionamento.







SMS







Usa camisinha.

O que são as doenças sexualmente transmissíveis (DST)?

As doenças sexualmente transmissíveis são as que passam de uma pessoa para outra através de relações sexuais. As mais conhecidas são: Sífilis, Gonorréia, AIDS e outras. As chamadas ou conhecidas doenças venéreas.

Saúde, Jsso sim é prazer.

Tem gente achando que transar com camisinha diminui o prazer. Mas prazer mesmo só existe quando há tranquilidade e a certeza de ter feito sexo seguro, portanto saudável. Aliás, o uso da camisinha pode prolongar a relação sexual e consequentemente o seu prazer.

O que é a Aids?

A AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - é uma doença causada pelo vírus HIV, que ataca as células responsáveis pela defesa do nosso corpo e é encontrado no sangue, no sêmen, na secreção vaginal e no leite materno de pessoas contaminadas, independente de sexo, cor, posição social ou idade.

As aparências enganam.

Uma pessoa contaminada com o HIV pode não ter nenhum sintoma durante anos. Mas mesmo assim, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Por isso, você deve usar camisinha toda vez que tiver uma relação sexual.

O melhor é prevenir. Porque remediar não dá.

Ainda não existe cura para a AIDS. Portanto, a prevenção é a melhor forma de não se adquirir a doença. Para isso:

- Use camisinha em toda relação sexual, seja ela vaginal, anal ou oral;
- Não compartilhe seringas ou agulhas, evite as drogas, evite a AIDS;
- Exija o controle do sangue nas transfusões;
- Cuidado ao manipular objetos cortantes sujos de sangue, pois se eles estiverem contaminados, você pode adquirir o vírus;
- Quando for ao dentista ou manicure, por exemplo, exija que os instrumentos sejam sempre esterilizados;
- Toda gestante deve fazer o teste Anti-HIV para evitar que o bebê adquira a doença.

Doses diárias de prevenção: Mudanças de comportamento.

Existem pequenas atitudes que você pode tomar para garantir a sua saúde e a de quem você gosta:

- Se você mantém relações fora do casamento, não ponha em risco a saúde da sua família: use preservativo;
- Converse com os seus filhos sobre o uso da camisinha: um diálogo pode garantir a sua tranquilidade e a saúde deles;
- Corra menos risco: reduza o número de parceiros(as) sexuais;
- Se você é usuário de drogas, e não puder deixar o vício, use somente agulhas e seringas descartáveis e não as compartilhe com ninguém;
- Em tempo de AIDS, nunca transe sem camisinha.

O preconceito é a pior doença.

AIDS não se pega com aperto de mão, beijo, abraço, compartilhando alimentos, talheres, assentos, piscinas, saunas, banheiros ou vasos sanitários. Por isso, não discrimine quem tem AIDS. A solidariedade é a melhor forma de ajudar o soropositivo a viver com esperança e alto astral.

Como usar a camisinha feminina:



Repare que o anel interno fica no fundo e o anel maior está colado na borda do saco.



Aperta-se o anel interno pelas bordas para que fique estreito e vira-se de cabeça para baixo.



Coloca-se o anel já estreitado na entrada da vagina e, com os dedos, se empurra o anel para dentro.



Você verá que o anel externo fica do lado de fora da vagina.



Durante a penetração do pênis, mantenha o anel externo em seu lugar





AIDS:

PREVENIR É DEFENDER A VIDA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS





CAMISINHA. SABER USAR FAZ BEM À SAÚDE.



 Quando o pênis estiver duro, desenrole a camisinha...



...apertando na ponta para sair o ar.



O Desenrole até embaixo.



 Não use lubrificante gorduroso.



Tire com ele duro, segurando.



6 Use só uma vez.

2 8

ONDE FAZER O TRATAMENTO:

SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA em HIV/AIDS e SERVIÇO AMBULATORIAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:

Realiza atendimento Médico, de Enfermagem, Psico-Social e Farmacêutico além do atendimento Odontológico exclusivo para portadores do HIV e pessoas com AIDS.

CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento: Realiza testes gratuitos para AIDS e Sifilis.

PAM - Salgadinho - (Bloco I) Rua Mizael Domingues nº 241 Fones: 336 3075 e 223 6788 R-215

PREVENÇÃO



Transe bem esta idéia.

SAIBA COMO EVITAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SEXO Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são doenças que você corre o risco de pegar quando faz sexo sem camisinha, com uma pessoa infectada. A maioria destas doenças pode ser curada, quando tratada por um médico. Se você quiser evitar o contágio, só existe uma saída: Use camisinha. • SÍFILIS:

ferida no pênis ou na vagina. Esta ferida surge duas ou três semanas após o contágio, não dói e some com o tempo. A pessoa pensa que está curada mas a sífilis continua no sangue. Meses depois surgem manchas pelo corpo, na sola dos pés e na palma das mãos. Estas manchas também desaparecem espontaneamente. Mas a sífilis, que persiste no organismo, se não for tratada, pode causar problemas graves nos olhos,

A primeira manifestação da sífilis se dá através de uma pequena

A sífilis, na gravidez, se não diagnosticada e tratada, pode ser transmitida para o bebê causando aborto, doença grave e até sua morte após o nascimento.

Usando camisinha, você estará se prevenindo.

coração e sistema nervoso.

 GONORRÉIA: É causada pelo gonococo. De dois a quatro dias após a relação sexual com alguém infectado, o homem ou a mulher sentirão

ardência ao urinar e dor nas relações sexuais . O sinal é um corrimento amarelo ou esverdeado que sai do pênis, vagina ou ânus. Sem tratamento a doença pode afetar o sistema nervoso, os ossos e o coração, além de causar esterilidade. Na mulher é mais difícil perceber os sintomas. Consulte um ginecologista periodicamente ou quando apresentar alguns sintomas de doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha é a sua melhor proteção.

URETRITE NÃO GONOCÓCICA:

É uma inflamação do canal da urina adquirida numa relação sexual com outra pessoa infectada. Os sintomas surgem de 8 a 10 días após o contato e são: desconforto ou ardência ao urinar, vontade de urinar a toda hora e secreção semethante à clara de ovo saindo do pênis. Mulheres, geralmente, não sentem e nem notam a infecção. Com camisinha você fica previnido.

HERPES GENITAL: Poucos dias após a relação sexual com uma pessoa infectada, pequenas bolhas agrupadas que ardem e doem muito aparecem no pênis, vagina ou ânus. As bolhas podem romper e virar feridas. As bolhas ou feridas desaparecem após cerca de duas semanas, mas atenção; o vírus fica para sempre no seu corpo e novos surtos podem ocorrer. Use sempre camisinha, você se protege e protege seus parceiros.

CANCRO MOLE:

São feridas dolorosas que aparecem no pênis, vagina e ânus, dois a cinco dias após a relação. Algumas vezes aparecem gânglios (ínguas) inflamados na virilha que podem causar pus. Só o médico poderá indicar o tratamento adequado. Previna-se, use camisinha!

CONDILOMA ACUMINADO:

È uma doença causada por um vírus com um período de incubação que varia de semanas a meses. No princípio aparecem uma ou duas verrugas nos orgãos genitais. Se não tratadas, estas verrugas crescem e se espalham. Quando muito grandes podem necessitar tratamento cirúrgico. E não esqueça, use camisinha e previna-se.

TRICOMAMNÍASE:

O principal sintoma da tricomamníase é um corrimento amarelo esverdeado com mau cheiro. Além disso é comum a dor na relação sexual, ardência, dificuldade para urinar e coceira nos orgãos genitais. A camisinha pode prevenir esta e outras DST's.

• CANDÍASE: Na mulher, ela causa um corrimento de cor branca, com aspecto de leite talhado, sem cheiro. Nos órgãos sexuais, tanto nas mulheres quanto nos homens, há vermelhidão e coceira. Pode haver ardência para urinar. O melhor é tratar logo e usar

das DST's.

• AIDS:

compartilhando seringas no uso de drogas injetáveis, procure um médico ou um centro de testagem para o HIV. Usar camisinha, ficar longe das drogas injetáveis ou não compartilhar seringas e agulhas são nossas melhores armas contra a AIDS. que ainda não tem cura. LEMBRE-SE: • A qualquer sinal de doença sexual, avise seu parceiro e

camisinha sempre, pois esta é a melhor forma de se manter livre

A AIDS é o estágio avançado da infecção causada pelo HIV, um

vírus que, progressivamente, vai destruindo as defesas naturais

do organismo e deixando-o sensível a algumas outras infecções.

Se você se expôs ao HIV em relações sexuais sem camisinha ou


procure imediatamente um profissional de saúde. Toda a demora em procurar cuidados médicos significa maior risco para você e seu parceiro. • A maioria das DST's são curáveis desde que as recomendações

médicas sejam rigorosamente seguidas. O balconista da farmácia ou seus amigos não estão

capacitados para tratá-lo.

 A existência de uma DST ou a exposição às DST's aumenta em muito o risco de transmissão do vírus da AIDS.

Disqu Saúd 0 00 61-1997 **Pergunte**









QUANTO MAIS VOCE CONHECE, MAIS SEGURO VOCE FICA. SOLIDARIEDADE


Iha aí, galera! Você conhece alguém que tenha o vírus da aids? Uma pessoa? Nenhuma? Você sabia que há muitas pessoas vivendo com o vírus da aids? Você sabia que há muitas pessoas na luta contra a aids?

> A aids é um problema de todos nós


Participe com a sua coragem e o seu amor. Faça parte do grupo que luta e coopera. Seja amigo: ame com cuidado e deixe-se amar!

SEJA UM ALIADO.

Renove a esperança. Combata o vírus com a arma da informação. Seja forte: permita-se dar e receber




depois, esvazie-a.






seringa com água sanitária, 2 vezes









SEJA RADICAL!

- Adote sempre prática segura.
- Recuse relações sexuais que não sejam seguras.
- Nas relações sexuais com uso do penetração, faça preservativo.
- Saiba recusar o uso de drogas.
- No caso de usar drogas injetáveis, não compartilhe seringas e agulhas.
- suspeita de Doencas Sexualmente Transmissíveis (DST), procure, de imediato, o serviço de saúde mais próximo de você.

APREND **A TRANSAR** COM A EXISTÊNCIA DA AIDS



QU N O MA S VOCÉ CONH CE, MA S SEGURO VOCÉ F CA.

Sexo

Você pode beijar, abraçar, acariciar... soltar sua imaginação. Mas, para chegar lá, só com camisinha - você entendeu, não?

Bem, se você quiser ficar por dentro...

Descole uma camisinha de alguma forma, comprando ou pedindo ao(à) seu(sua) amigo(a). Converse com seu(sua) gato(a).

Carícia vai, carícia vem, aproveite a ereção e vista a camisinha.

Mas observe bem: aperte com os dedos a ponta da camisinha, pois é aí que ficará o esperma.

Não deixe entrar ar. Desenrole a camisinha com carinho, tomando cuidado para não rasgar.


Aí, você estará pronto.

A camisinha protege do vírus da aids e de outras doenças transmitidas em relações sexuais.











Drogas

Muitas pessoas usam drogas. Algumas entram numa de usar inietável. Isso acontece durante algum tempo de suas vidas. No entanto, esta é a forma mais arriscada para se pegar doenças como a aids. Se você está nessa. proteja-se!


Seja único

Compartilhar a mesma seringa é o fim.

Porém, se só houver uma, o jeito é limpar. Faça o seguinte:

- 1º passo: encha a seringa duas vezes com água limpa e vá jøgando a água na pia ou no raio.
- 2º passo: encha agora a seringa duas vezes com água sanitária. Conte de 101 a 130 (para dar o tempo de 30 segundos), cada vez que esvaziar a seringa na **pia ou no raio.**
- 3º passo: novamente, encha a seringa duas vezes com agua limpa e esvazie-a na **pia ću no ralo.** :





PARA UMA NOVA VIDA





CAMISINHA

- 1. Abrir a embalagem só na hora de usar.
 2. Apertar ou enrolar o bico para tirar o ar.
- 3. Colocar a camisinha somente com o pênis duro, ereto. Desenrolar vagarosamente até a base do pênis, próximo aos pêlos pubianos.
 4. Retirar a camisinha logoapós a ejaculação, enquanto o pênis estiver duro, com cuidado para o sêmem não vazar.
 5. Dar um nó e jogar no cesto de lixo

Outras Dicas: Verifique o selo de garantia do INMETRO e a data de validade do produto. Se a embalagem estiver danificada ou aberta, joque fora a camisinha: Use a cafnisinha desde o inicio até o final da penetração vaginal ou anal. Não funciona colocá-la apenas no momento de ejacular. Seu uso fambém é indicado para a prática de sexo oral nos homens. Quase todas as camisinhas disponíveis no mercado já são lubrificadas. Mas se você precisar de lubrificação extra, use somente lubrificantes solúveis em água (tipo KY e lette de aveia D'Avene).

Projeto "Adolescente Vivo" - GAIA

RUA SÓCRATES DINIZ, 05 - CENTRO - ANÁPOLIS - GOIÁS - BRASIL - FONE: (062) 324-5144

Fotografia e Produção:

LUCIANO MEDEIROS

Agradecimentos aos modelos:

ALEXANDRE PIRES E HELENA CÂNDIDA, que cederam gentilmente suas imagens; os mesmos não são soropositivos ao HIV.

RECURSOS FINANCEIROS:



Shell Brasil S.A.

FECAD - Fundo Estadual da Criança e Adolescente

Apoio:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANÁPOLIS

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - GOIÁS

FORUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

REALIZAÇÃO:



GRUPO DE APOIO AO IRMÃO COM HIV/AIDS C. G. C. 97.509.541/0001-61



DESABROCHAR

Tudo no mundo é natural; nascer, crescer e morrer.
O sexo também é natural; tem seu tempo e lugar para acontecer.
A responsabilidade e a consciência é de cada um.

A REAL


Hoje em dia com a AIDS, para a qual ainda não se conhece uma cura ou uma vacina, é preciso ter muito cuidado! Não é necessário desistir de sua vida sexual, mas é fundamental mudar certos hábitos.

E Eu?!!

Na adolescência o sentimento de poder, e descoberta é grande, e tudo acontece muito rápido. Então é importante estar prevenido(a). A AIDS é real e a única forma de prevenção é a camisinha.

Camisinha

Independente do que você já ouviu, do que você



pensa, não vale a pena arriscar! Camisinha não é tão ruim, nem tão complicada de usar. É fácil protege-se contra a AIDS.

TRANSMISSÃO

A AIDS é transmitida pelo contato sexual com pessoa contaminada (tanto com homens quanto com mulheres); pelo sangue contaminado, e da mãe contaminada para o filho durante a gravidez, no parto e também no aleitamento.

A AIDS não se transmite na convivência diária, nem na piscina, suor, beijo, aperto de mão/abraço, toalha, sabonete, talheres/copos, picada de insetos, assentos de ônibus, sanitários, etc.

Lembre-se: Ser solidário e amigo não coloca você em risco, e ajuda quem está contaminado.

A AIDS uma doença e não um comportamento.

> Deus não faz acepção de pessoas!!!



AIDS, ASSIM PEGA

 Relação Sexual - todas as formas de transar que têm penetração (seja na vagina, no ânus ou na boca) podem passar o virus da AIDS. TEM QUE USAR CAMISINHA!

 Transfusão de Sangue - exija sangue com certificado de teste de AIDS, se você precisar de uma transfusão.





 Troca de Seringas (injeção) - se o sangue de uma pessoa contaminada fica na agulha ou dentro da seringa, o vírus passa para quem usar. PREFIRA SERINGAS DESCARTÁVEIS!

4. Gravidez e Amamentação - a mulher contaminada pelo HIV passa o vírus para o feto na gravidez, no parto ou durante a amamentação. FAÇA O EXAME DE SANGUE E CONTROLE PRÉ-NATAL DESDE O COMEÇO DA GRAVIDEZI



ASSIM NÃO PEGA

- Ficar no mesmo ambiente, apertar a mão, trabalhar ao lado de alguém portador do HIV.
- 2. Beijar, dar carinho e atenção aos portadores do HIV.
- 3. Picada de insetos.







A CAMISINHA

1. PONHA COM O PIRU DURO.





4. NÃO USE CREME, ÓLEO OU VASELINA. SÓ PRODUTOS À BASE DE ÁGUA.





SE VOCÊ ESTIVER COM UMA DOENÇA TRANSMITIDA PELO SEXO, PROCURE O CENTRO DE SAÚDE. LÁ VOCÊ ENCONTRA O TRATAMENTO GRATUITO.

Rio de Janeiro

Campos

 *Centro de Referência da Criança e do Adolescente Rua Gil de Goes, 157 - 28100-000 - Campos/RJ Telefone: (0247) 22-0993 Ramal 231

Macaé

*COAS

Rua Visconde de Quissamă, 355 - Centro 27910-290 - Macaé/RJ - Telefones: (0247) 67-9397 / 62-1850

Niterói

+Centro de Saúde Santa Rosa Praça Vital Brasil, s/nº - Santa Rosa - 24230-340 - Niteról/RJ Telefone: (021) 710-9176

Nova Iguaçu

*COAS

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2.370 - Sala 303 26210-190 - Nova Iguacu/RJ - Telefone: (021) 767-9812

Rio de Janeiro (CTA)

*Unidade Integrada de Saúde Rocha Maia Rua General Severiano, 91 - Botafogo 22290-040 - Rio de Janeiro/RJ - Telefone; (021) 295-2295

Rio de Janeiro (Madureira)

*Unidade Integrada de Saúde H. Pinheiro Av. Min. Edgar Romero, 276 - Madureira 21360-200 - Río de Janeiro/RJ - Telefone; (021) 350-9211

Rio de Janeiro (UTA)

 Hospital Escola São Francisco de Assis
 Av. Pres. Vargas, 2.863 - Cidade Nova - 20210-030 - Rio de Janeiro/RJ -Telefone: (021) 293-2255 - Fax: (021) 293-1042

Volta Redonda

*Rua 566, 31 - Nossa Senhora das Graças 27295-390 - Volta Redonda/RJ - Telefone: (0243) 80-0202

SE VOCÊ QUER SABER SE ESTÁ COM O VÍRUS DA AIDS, PROCURE OS CENTROS DE TESTAGEM ANÔNIMA.

CENTROS DE TESTAGEM ANÔNIMA PARA HIV/AIDS

*Hospital Escola São Francisco de Assis - COAS/Centro Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova Rio de Janeiro - fone: 293-2255

*Unidade Integrada de Saúde Rocha Maia - COAS/Botafogo Rua General Severiano, 91 - Botafogo Rio de Janeiro - fone: 295-2295

*Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro COAS/Madureira - Av. Ministro Edgard Romero, 278 - Madureira Río de Janeiro - fone: (021) 350-9211 ou 390-1217

> *Centro Municipal de Saúde Santa Rosa COAS Santa Rosa/Niterói - Av. Vital Brasil, s/nº Santa Rosa - Niterói - fone: 711-2366

*COAS/Nova Iguaçu Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu Av. Marechal Floriano, 2.370 - Sala 303 Nova Iguaçu - Fone: 767-9812

E lembre-se: pintou doença transmitida pelo sexo, vá logo ao médico! Não se trate na farmácia!

DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO SEXO. INFORME-SE

E PREVINA-SE.



UNIDOS NA ESPERANCA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUSC/CV PROGRAMA DE CONTROLE DE DST/AIDS Secretarias Municipais de Saúde Ministério da Saúde PN-DST/AIDS





GOVERNO DO ESTADO







O QUE SÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST)?

São doenças contagiosas, ou seja, passam de uma pessoa para outra, através da relação sexual. A pessoa portadora de DST pode não sentir nada (ver sintomas), mas pode passar a doença para seu parceiro. A maioria das DST tem cura. É importante procurar um médico. Os postos de saúde estão preparados para tratá-las. Medicamentos e camisinha são fornecidos gratuitamente nos postos. Usando a camisinha você se protege das DST. Se você tem algum sintoma de DST, avise logo a pessoa ou as pessoas com quem você transou. Ah, e por falar nisso, quanto mais você troca de parceiro, mais chance você tem de pegar uma DST.



Os principais inimigos da saúde sexual são invisíveis. São os micróbios (vírus e bactérias). Eles aproveitam a relação sexual para passar de uma pessoa para outra. Com o remedio certo os micróbios morrem e as pessoas saram. Mas é melhor que eles nem entrem no seu corpo. Use sempre camisinha.



A maioria das Doenças Sexualmente Transmissiveis (DST) não apresenta sintomas fortes nas mulheres, quando estão no início. Isso porque o órgão sexual da mulher é "para dentro", enquanto que o do homem é "para fora". Por isso, as mulheres precisam fazer exames com o ginecologista (médico de mulher), pelo menos uma vez por ano. Se a mulher tem um corrimento (secreção vaginal) que não dá coceira, não tem cheiro, é transparente e em pouca quantidade, não é doença. Qualquer alteração, é bom perguntar ao médico o que está acontecendo.



SINTOMAS DA SÍFILIS

Primeiro, aparece uma feridinha no pênis ou na vagina, alguns dias depois da transa. A ferida não dói, some com o tempo e a pessoa pensa que está curada. Por isso, a Sífilis é uma doenca complicada. Meses depois, surgem manchas pelo corpo, até na sola do pé e na palma da mão. Essas manchas também somem, mas a Sifilis continua no sangue. Se não for tratada logo, pode causar cequeira, paralisia, doença nervosa, problemas do coração e até a morte.





A mulher grávida deve fazer exame de sanque logo no comecinho da gravidez. Se ela tiver Sifilis, a doença pode provocar o aborto ou passar para o bebê, causando doença grave ou a sua morte. Outros sintomas da Sífilis são verrugas na região genital, feridas na boca, inquas no corpo, tebre e dores nas juntas, além de queda de cabelos.

SINTOMAS DA GONORRÉIA

O sinal é um corrimento amarelado ou esverdeado, ou até mesmo um pouco de sanque, que sai do pênis, da vagina ou do ânus. Isso aparece de 2 a 8 dias depois da transa. Dói para urinar e para transar. Se não tratar logo, a pessoa pode ficar estéril (incapaz de ter filhos). Sem tratamento, a doença pode afetar o sistema nervoso, os ossos e o coração. Na mulher é mais difícil perceber os sintomas. Por isso, ela deve procurar um ginecologista (médico de mulher), sempre que sentir alguma coisa diferente em seu corpo, ou pelo menos uma vez por ano.



SINTOMAS DAS URETRITES

No homem, a uretrite dá um corrimento parecido com a água e vontade de fazer xixi toda hora. Mas arde muito para xixi. Na mulher, a doença urinar. A mulher também pode vezes, não sente nada. Os sintomas aparecem de 8 a 10 das depois da relação sexual.

SINTOMAS DA CANDIDÍASE

Muita coceira nos órgãos sexuais (pênis ou vagina) que ficam bem vermelhos. Arde multo para fazer provoca um corrimento branco, sentir ardência ao urinar, mas, as que nem leite azedo, e pode dar até infecção urinária, com dores fortes. Tem que tratar logo, senão atinge as partes internas do corpo.

SINTOMAS DO LINFOGRANULOMA

Essa doenca começa com uma feridinha, no pênis ou na vagina. Depois, surgem inquas nas virilhas, que incham até abrir, soltando pus. Quem tem relação sexual anal, pode sentir dor para fazer cocô.

SINTOMAS DO CANCRO MOLE

Os sintomas são feridas com pus que aparecem na cabeça do pênis e na parte externa do órgão sexual da mulher (chamada vulva). Tem que tratar logo, senão aparecem mais feridas.

SINTOMAS DA TRICOMONÍASE

O sintoma é um corrimento amareloesverdeado com mau cheiro. Dól para transar. Os órgãos genitais cocam muito e fica ruim para fazer xixi.



SINTOMAS DO CONDILOMA ACUMINADO

No começo, aparecem uma ou duás verrugas nos órgãos sexuais ou em volta do ânus. Se não tratar, as verrugas crescem e se espalham. Se a doenca avancar muito, pode precisar até de operação. Nas mulheres grávidas, a doença pode formar tumores, porque se desenvolve mais rapidamente.

OS SINTOMAS DO HERPES GENITAL

Muita ardência e dor no local, com pequenas bolhas agrupadas no pênis ou na vagina. É o Herpes Genital. Não se deve cocar, porque a bolha vira ferida. Pode aparecer corrimento e dificuldade para urinar. Atenção: as bolhas somem com o tratamento, mas o virus fica para sempre no seu corpo. Tem que fazer o tratamento para as bolhas não voltarem. Usando camisinha não passa a doença para o parceiro ou parceira.

AIDS

Você viu que as DST provocam feridas nos órgãos sexuais (pênis ou vagina). Assim, elas facilitam que uma outra doença também sexualmente transmissivel entre no seu corpo. É a AIDS. O virus que provoca a AIDS se chama HIV. Ele destrói as defesas naturais do organismo, enfraquece a pessoa e ela pega outras doencas (como a pneumonia, tuberculose, etc.). Só o médico, através de exame de sanque, pode dizer se a pessoa está ou não contaminada pelo HIV. A AIDS ainda não tem cura. Por isso, a única maneira de ficar livre dela é se prevenindo. Se você tem algum sintoma de DST, procure um médico. As pessoas com DST tem até 18 vezes mais chances de pegar AIDS! Use sembre camisinha! Ela protege você das DST e da AIDS.





Para maiores informações, procure o Centro de Serviços Educacionais Colgate. Tel.: DDG 0800-124646 ou Caixa Postal 61049. CEP 05071-970 - São Paulo.






3. Mantenha uma alimentação saudável e completa.



4. Visite regularmente seu dentista.





Deslize o fio dental no espaço entre os dentes suavemente em direção à gengiva.



Curve o fio sobre a superficie de cada dente e movimente-o verticalmente para remover a placa.

Use creme e enxaguante bucal que contenham flúor.



O flúor protege contra as cáries.




O enxaguante completa a bigiene bucal.





1. Faça a higiene completa dos dentes após cada refeição.






Posicione a escova num ângulo de 45º na junção do dente com a gengiva.




Faça movimentos rotatórios, vibrando a escova suavemente, por grupo de 2 dentes.



Faça movimentos de vai-e-vem na área de mastigação.



Deslize a escova no sentido da gengiva para a área de mastigação.




Enrole 45 cm de fio dental em volta do dedo médio de cada mão.

GRUPO DE AÇÃO DE PELA CIDADANIA HOMOSSEXUAL

Propomos a construção de uma identidade que promova e garanta nossos direitos, nossa condição de cidadãos plenos e o respeito aos nossos afetos.

Venha conhecer o Identidade, um lugar onde aqueles que respeitam as diferenças sentem-se felizes de estar, colaborar e conviver.



Rua Álvares Machado, 350 Centro CEP:13013-070 Campinas - SP Fone: (19) 3237-3436/3234-8953 E-mail:<u>identidade-cps@bol.com.br</u> Homepage: www.identidadecampinas.hpg.com.br Caixa postal nº 546 - CEP: 13012-970 Nossa missão é afirmar socialmente a diversidade sexual humana e combater a intolerância, o preconceito e a discriminação decorrentes da homofobia, por meio de ações diretas e iniciativas institucionais voltadas tanto à comunidade GLTTB (Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais), quanto à sociedade em geral, atuando em Campinas e Região, com articulação Estadual, Nacional e Internacional.

290













Apoio:

Prefeitura Municipal de Campinas Programa Municipal de DST/AIDS IGUALDADE COM RESPEITO
PARA TODOS

Somos o Identidade - Grupo de Ação Pela Cidadania Homossexual, uma ONG (Organização Não Governamental) sem fins lucrativos, sem filiação partidária ou religiosa, fundada em 19 de maio de 1998, na cidade de Campinas/SP.

Temos como prioridade a construção da cidadania homossexual, por meio da luta constante contra qualquer tipo de discriminação por orientação sexual e da promoção da auto-estima de gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais da cidade de Campinas e Região.

Para tanto, realizamos reuniões dominicais pautadas pela troca de experiências e vivências entre iguais, respeitando-se as diferenças. Respondemos à intolerância social com ações voltadas ao cumprimento da legislação vigente.

Promovemos o respeito às diferentes expressões de afeto e sexualidade, através da participação em vários Fóruns Municipais e Estaduais de discussão, proposição e fiscalização de políticas públicas específicas.

UMA INSTITUIÇÃO FOCADA NA DIVERSIDADE SEXUAL



A CAMISINHA PROTEGE VOCÊ DA AIDS

Usando-a corretamente, você evita também a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis



Rasgue cuidadosamente a embalagem com a mão e retire a camisinha.



Desenrole a camisinha até a base do pênis, segurando a ponta para retirar o ar.



Depois da relação, retire a camisinha do pênis ainda duro, com cuidado para não vazar.



Use a camisinha uma só vez. Depois de usada, dê um nó e jogue no lixo.

Distribuição gratúita em todas as Unidades de Saúde.





SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DIVISÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO DE DST/Alds



O que preciso sabe



Doenças S_{exualmente} ransmissíveis

Essas doenças são transmitidas nas relações sexuais com pessoas contaminadas. Algumas delas nem são percebidas no início, mas, com o tempo, se manifestam de forma grave.

Muitas pessoas têm vergonha de procurar um médico ao contraírem uma Doença Sexualmente Transmissível, e acabam tomando remédios caseiros ou pedindo conselhos a pessoas não habilitadas (balconistas de farmácia ou amigos), o que dificulta a cura. Procure sempre um Posto de Saúde.

TIPOS DE DOENÇA

Condiloma Acuminado

Também conhecido como Crista de Galo. No início, aparecem uma ou duas verrugas em volta do pênis, vagina ou ânus. Sem o tratamento adequado, as verrugas crescem, agrupam-se ficando com a aparência de couve-flor e se espalham. Se a doença avançar, é necessário fazer uma operação para obter a cura. Nas mulheres, a doença pode levar à formação de tumores.






Herpes Genital

O Herpes Genital manifesta-se, inicialmente, por pequenas bolhas agrupadas no pênis, na vagina ou no ânus. Essas bolhas podem arder e causar uma coceira muito intensa. Ao se coçar, o próprio doente pode romper as bolhas, fazendo surgir uma ferida. Podem aparecer também corrimento e dificuldade para urinar.

ATENÇÃO: As bolhas somem mesmo sem tratamento, mas o vírus fica para sempre no seu corpo. A doença é transmitida no período de bolhas ou feridas



Cancro Mole

O Cancro Mole, ou Cavalo, manifesta-se de dois a cinco dias após a relação sexual com uma pessoa que tenha a doença. Os sintomas são feridas dolorosas e com pus que aparecem na cabeça do pênis, na parte externa do órgão sexual da mulher (chamada vulva), no ânus e, mais raramente, na vagina. Deve ser tratada logo, se não aparecem mais feridas, dificultando até o andar.

Sífilis Recente (Cancro Duro)

É uma doença que afeta homens e mulheres e pode levar a complicações graves. A primeira manifestação é uma pequena ferida indolor que some em alguns dias mas doença continua no sangue. Aparecem manchas na palma das mãos e dos pés. Essas somem e a doença continua. Somente o tratamento correto poderá eliminar a doença. Procure um médico.



Tricomoníase

Na mulher, esta doença se localiza na vagina ou em partes internas do órgão genital. No homem, só nas partes interas. Os principais sintomas da Tricomoníase são: corrimento amarelo esverdeado com mau cheiro, dor durante o ato sexual, ardência e dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais.

Leve seus parceiros ou parceiras para consultarem também com o médico.

Candidíase

A Candidíase é uma doença que é provocada pela diminuição da imunidade (por doença, gravidez ou stress) e que tambémpode ser transmitida pelo ato sexual. Os principais sintomas são: vermelhidão e coceira nos órgãos sexuais (pênis ou vagina) e argência ao urinar. Na mulher, causa



um corrimento de cor branca com aspecto de leite talhado que não possui cheiro. Deve ser tratada logo, senão a doença atinge as partes internas do corpo, dificultando a sua cura.



Gonorréia

Corrimento amarelo ou amarelo esverdiado e até mesmo com sangue que saida vagina ou do pênis. Surge de 2 a 8 dias depois da relação sexual. Os sintomas são ardência ou dor ao urinar e o corrimento. O não tratamento pode deixar a pessoa estéreo ou afetar o sistema nervoso, os ossos e o coração. Ao perceber os sintomas consulte o médico.



VISTA-SE: Use sempre camisinha. Para sua proteção.

A prevenção é responsabilidade de todos

- R Faça sexo seguro. Use preservativo.
- Evite o uso de drogas e não compartilhe seringas.
- Ao receber sangue em transfusões certifique-se da origem do mesmo.
- O HIV/Aids não é transmitido: em bancos, vasos sanitários, telefones, copos e talheres, tosse, espirro, suor, saliva.



Serviços oferecidos pela FAÇA

Além do Projeto Aids e Qualidade de Vida no Trabalho, a FAÇA oferece ao público em geral:


- Grupo de Psicoterapia,
- Projeto FAÇA-Direito,
- FAÇA-Voluntariado,
- FAÇA-Treinamentos,
- FAÇA-Sustentabilidade

Rua Ferreira Lima, 82 - centro - Florianopolis-SC Cep: 88015-420 | tone/fax: (0-48) 223 6075 www.ufsc.br/-faaids | fapcaids@unetsul.com.t

Materia Materia

Aids e Qualidade de Vida no Trabalho

Se a sua empresa pensa na saúde do trabalhador...



...pense num programa de prevenção e assistência à epidemia do HIV/Aids.

A epidemia do HIV/Aids está cada dia mais presente na vida das pessoas, mostrando que todos os segmentos da sociedade estão sendo atingidos da mesma forma.

No Brasil, até novembro de 1999 foram notificados 179.083 casos de Aids. A cada 19 minutos é notificado um caso de Aids. Santa Catarina é o terceiro estado em incidência (taxa por 100.000 hab.) com 7.044 casos. A principal via de transmissão é a sexual correspondendo a 55% das notificações.

Aproximadamente 82% da população infectada pelo vírus HIV possuientre 20 e 44 anos.

A incidência da Aids em populações jovens impedirá que muitas pessoas ingressem no mercado de trabalho ou fará com que estas saiam do mercado antes de completar o ciclo ativo da vida. Isto traz repercussões sócioeconômicas que afetam direta e indiretamente as empresas. Alguns estudos apontam, que a cada R\$ 1,00 investido em atividades de prevenção, são poupados R\$ 36,00 em futuros gastos em assistência.

Por isso várias empresas desenvolvem programas de prevenção e assistência ao HIV/Aids junto aos seus empregados e familiares. Esses programas trazem retorno financeiro e promovem o marketing institucional das empresas, mostrando seriedade e responsabilidade com a saúde do trabalhador.

investimento em bons programas de prevenção: evita despesas futuras com recursos assistenciais; aumenta a competitividade e produtividade; minimiza preconceitos e discriminações.

Investir em prevenção é investir na qualidade de vida do trabalhador.

Pensando nisso o programa "Aids e Qualidade de Vida no Trabalho", desenvolvido pela FAÇA, tem dentre seus objetivos:

- Assessorar as empresas no desenvolvimento de programas de prevenção ao HIV/Aids.
- Trabalhar preconceitos e discriminações, minimizar sofrimento.
- Reduzir os custos decorrentes da epidemia.
- Produzir e distribuir material informativo específico.

Direitos trabalhistas e à saúde:

Nenhuma empresa pode exigir o teste anti-HIV para admissão do trabalhador;

£6.66666666666666666

Ninguém pode perder o emprego por estar com o vírus HIV:

Trabalhadores soropositivos tem direito à liberação do PIS e do FGTS, a auxílio doença e a deixar pensão para seus dependentes;

Todo cidadão tem direito ao atendimento de saúde gratuito, inclusive acesso a medicamentos;

O exame anti-HIV pode ser feito no Serviço Público de Saúde. O resultado deste é confidencial.

Fontes: Ministério da Saúde Nelson Solano

2

1

7

15



O tratamento e um direito da pessoa que vive com o HIV e os remedios que diminuem o número de virus no organismo são distribuidos gratuitamente na rede pública de saúde.

A AIDS AINDA NÃO TEM CURA MAS TEM TRATAMENTO!





Na Parte interna deste folheto, veja os endereços onde se pode fazer o teste da AIDS Fique atento: Uma pessoa com o HIV pode viver bem muitos anos - sem apresentar sinais ou doenças - mas, mesmo assim, pode passar o virus para outras pessoas através das relações sexuais sem camisinha.

O QUE E AIDS? A AIDS é causada por um vírus, o HIV. Este virus destrói as defesas naturais do organismo, enfraquece a pessoa e ela pode pegar outras doenças (como pneumonia, tuberculose, etc.). Só um profissional de saúde, através do exame de sangue, pode dizer se a pessoa está ou não contaminada pelo HIV.

CONVERSE



ASSIM PEGA:

- 1- Relação sexual Todas as formas de relações sexuais que têm penetração (seja na vagina, no ânus ou na boca) podem passar o HIV.
- 2- Sangue: Se uma pessoa com HIV doa sangue ou órgãos, pode passar o vírus para quem recebê-los.
- 3- Troca de seringas: Se o sangue de uma pessoa com HIV fica dentro da agulha ou da seringa, mesmo em quantidade bem pequena, o virus pode passar para quem usá-la.

- 4- Gravidez e amamentação: A gestante com o HIV pode passar o vírus para o bebê na gravidez, na hora do parto ou durante a amamentação. Por isto,
 - toda gestante deve fazer o teste da AIDS, pois já existem remédios que podem evitar que o HIV seja transmitido ao bebê.

As mulheres com HIV não devem dar o leite do peito.

COMO EVITAR A AIDS:

- 1 Utilizando a camisinha masculina ou a camisinha feminina adequadamente em todas as relações sexuais com penetração (vaginal, anal ou oral).
- 2 Utilizando agulhas e seringa descartáveis. Se você não consegue deixar de usar drogas, seja solidário, mas não compartilhe nenhum material com seus parceiros de drogas.



- 3 Exija sangue com certificado do teste da AIDS se você precisar receber uma transfusão de sangue. Também as pessoas que cuidam de pessoas com aids, precisam de cuidados especiais quando lidam com sangue ou secreções corporais.
- 4- É importante saber quando se tem o vírus da AIDS pois se o acompanhamento médico é logo iniciado, são muitas as chances de manter uma boa qualidade de vida. Também se poderá ter mais cuidados para não passar o vírus a outras pessoas.

APRENDA

Continue atento:

A sífilis, a gonorréia e outras doencas transmitidas principalmente pelas relações sexuais podem facilitar a entrada do HIV no organismo.

Ao menor sinal de uma doença sexualmente transmissivel (verruga, ardência, feridas, corrimento), nos órgãos sexuais ou próximo a eles, procure um Centro de Saúde.

Não se trate na farmácia!

A AIDS NÃO PASSA:

- Pelo contato social e convivência.
- Por picadas de insetos.
- Pelo beijo, carícias, abraços e
- Pelo uso de vasos sanitários.
- Pelo uso comum de pratos. talheres, copos e toalhas.
- Pela masturbação à dois.
- Pela ajuda e carinho com as pessoas que vivem com HIV ou AIDS.

E SE EU OUISER FAZER O TESTE DA AIDS?

Você pode procurar um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) ou um Centro de Saúde. O Teste é gratuito. Em caso de dúvida, procure a Secretaria Municipal de Saúde da sua Cidade.

RIO DE JANEIRO - CTA SÃO FRANCISCO DE ASSIS AV. Presidente Vargas 2863 -CENTRO.- Disc-aids: 293-2255

- CTA ROCHA MAIA/ CTA BOTAFOGO R. General Severiano 91- Botafogo.

- CTA MADUREIRA Av. Ministro Edgar Romero 278 -Madureira.

- CTA GAFFREE E GUINLE Rua Mariz e Barros 775. - Tijuca. NITERÓL

- CTA NITERÓI

Praça Vital Brasil sem número -Santa Rosa - Niterói.

DUOUE DE CAXIAS - CTA DUQUE DE CAXIAS Rua General Argolo sem número -Centro. Duque de Caxias - Tel 671-7659.

NOVA IGUACU - CTA NOVA IGUAÇU Rua Bernardino de Melo 1895 -Centro Nova Iguaçu

VIVA!

Usando corretamente a camisinha masculina você evita a AIDS pela relação sexual e também outras doencas sexualmente transmissíveis. Tenha sempre uma com você.









Agora já existe uma camisinha feminina que também evita a AIDS. Ela é como um saco plástico com dois anéis, um em cada extremidade. Um anel é inserido na vagina até o colo do útero e o outro fica de fora. Para mais informações, procure um servico público de saúde.



Converse sobre AIDS com as suas parcerias sexuais, com os amigos e na comunidade. Juntos, podemos encontrar melhores soluções para evitá-la ou tratá-la.

SÃO JOÃO DE MERITI - CTA SÃO JOÃO DE MERITI Rua Pastor Joaquim Rosa, sem número. Vilar dos teles.

MACAÉ - CTA MACAÉ Rua do Sacramento 222 - Imbetiba -Macaé Tel. 772-9397.

> VOLTA REDONDA - CTA VOLTA REDONDA Rua 566, número 3. Nossa Senhora das Gracas.

> > CAMPOS - CTA CAMPOS Rua Gil de Góes 157 Disc-aids: 733-3335.



Não se esqueça, é sempre melhor usar camisinha nas relações sexuais, lembrando-se que ela estará aliada às duas mediadas extremamente corretas: o planejamento familiar e a prevenção contra as DST/AIDS.

Como usar a camisinha masculina:



Coloque sempre a camisinha antes do início da relação sexual. Coloque a camisinha quando o pênis estiver duro.

Não deixe a camisinha apertada na ponta do pênis. Deixe um espaço vasio (2cm) na ponta da camisinha; ele vai servir de depósito de esperma.

Aperte o bico da camisinha até sair todo o ar. Cuidado para não apertar com muita força, para não estragar a camisinha.



Encaixe a camisinha na ponta do pênis, sem deixar o ar entrar. Vá desenrolando até que ele figue todo coberto. Se ela não ficar bem encaixada ou se ficar ar dentro, a camisinha pode rasgar.



Não se deve passar nada na camisinha. Se quiser que ela fique lisa na penetração, use as já lubrificadas. Em último caso, use apenas lubrificantes feitos à base



Depois de gozar, retire o pênis enquanto estiver duro. Quando o pênis começa a amolecer, a camisinha fica frouxa, permitindo que o esperma escape pela parte de cima.



Retire a camisinha com cuidado: não deixe que ela escorregue, nem que o líquido seja derramado. Depois de retirada a camisinha, embrulhe em papel higiênico e jogue no lixo.

A fidelidade mútua, o respeito ao parceiro e o amor ainda são doses certas de prevenção. Converse sobre este assunto e cultive isso no seu relacionamento.

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DST/AIDS









SMS

O que são as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)?

São doenças que passam de uma pessoa para outra através de relações sexuais. As DST mais conhecidas são: Sífilis, Gonorréia, Cancro Mole, Herpes Genital, Tricomoníase, Condiloma Acuminado (Crista de Galo) e a AIDS.

Se você está grávida, você tem mais um motivo para se cuidar: a saúde do seu bebê.

0 que éAIDS?

A AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - é também uma doença sexualmente transmissível, causada pelo vírus HIV. Este vírus ataca as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, destruindo a resistência do organismo, deixando-o vulnerável a várias doenças oportunistas. O vírus é encontrado no sangue, no sêmen, na secreção vaginal, fluidos corporais e no LEITE MATERNO de pessoas contaminadas, independente de sexo, cor, posição social ou idade. Se a mulher grávida estiver contaminada, o bebê corre risco de se contaminar durante a gestação, parto ou até no período de amamentação, através do leite materno.

Doses diárias de prevenção:

Mudanças de comportamento...

Existem pequenas atitudes que você pode tomar para garantir a sua saúde e a de seu filho:

- Converse com seu marido sobre a necessidade do uso da camisinha;
- Converse com os seus filhos: um diálogo pode garantir a sua tranquilidade e a saúde deles;

- · Corra menos risco diminua o número de parceiros;
- · Faça um planejamento familiar, para a próxima gravidez;
- Se você mantém relações fora do casamento, não ponha em risco a saúde de sua família - use preservativo.

O que você já deve fazer pelo seu filho:

- Toda mulher grávida deve fazer acompanhamento pré-natal inclusive a investigação para sífilis, e outras DST;
- Procure um profissional da saúde e faça o teste Anti-HIV (gratuito) nos serviços públicos de referência;
- Se o resultado for positivo, faça o tratamento imediatamente. O uso do AZT pode reduzir o risco do bebê nascer infectado pelo vírus da AIDS.
- Todo recém-nascido de mãe portadora do HIV deve receber AZT nas primeiras 6 semanas de vida, e depois ser acompanhado por profissional da saúde;
- Mulheres portadoras do vírus HIV NÃO DEVEM AMAMENTAR.

O destino do seu bebê nas suas mãos.

Lembre-se: em algumas doenças, mesmo sem tratamento, os primeiros sintomas desaparecem, mas a doença não. Se você suspeitar que pode ter alguma DST/AIDS, procure urgentemente atendimento médico.

Como usar a camisinha feminina:



Repare que o anel interno fica no fundo e o anel maior está colado na borda do



Aperta-se o anel interno pelas bordas para que fique estreito e vira-se de cabeça para baixo.



Coloca-se o anel já estreitado na entrada da vagina e, com os dedos, se empurra o anel para dentro.



Você verá que o anel externo fica do lado de fora da vagina.



Durante a penetração do pênis, mantenha o anel externo em seu lugar



TRANSMISSÍVEL PEGAR VOCÊ. MAS LEVE A VIDA A SÉRIO. **DOENÇA SEXUALMENTE OU QUALQUER OUTRA** E ENTRE PRO CORDÃO **QUANDO FOR BOTAR** E SE DIVIRTA MUITO, NÃO DEIXE A AIDS **NESSE CARNAVAL,** O BLOCO NA RUA **USE CAMISINHA** PULE, BRINQUE

DOS PREVENIDOS.

Se você acha que pegou alguma doença sexualmente transmissível, não tenha vergonha de procurar ajuda. Se ela não for tratada logo, as consequências podem ser graves.

Em caso de dúvidas, procure o posto de saúde mais perto de sua casa ou disque AIDS: 220-1414

FORUM GOIANO DE LUTA CONTRA DST/AIDS

Grupo AAVE (Aids: Apoio, Vida, Esperança) - 293-5882 1 Condomínio Solidariedade (OVG) - 546-9489 - FAX 29988 Comunidade dos Herdeiros da Luz - 242-3803 (1 5929663 Associação Ipê Rosa - GLSTB - 223-0128 CADA - Casa de Apoio ao Doente de AIDS - 249-1634 AGLT - Associação de Gays, Lésbicas e Travestis - 213-6222 Grupo Transas do Corpo - 241-9257 - Grupo Pela Vidda - 212-7178 · Gente Livre - Centro de Prevenção ao Uso de Drogas - 261-5919 Aguas de Merimbá - 562-1400 Grupo Eles por Eles - 213-6222 Liga DST/AIDS - 202-4775 • Planeta Mulber Aville Planeta Mulher Astro 2000 - 215-1851 Gosp HIV+ - Grupo de Orientação do Soropositivo (Rio Verde-GO) - 620-2059 - 62139 OVG - Organização dos Voluntários de Goias - 546-9437 Coordenação de DST / AIDS SABS/GO - 291-5022 SESI - Serviço Social da Indústria - 219-1337

• SESC/GO - Serviço Social do Comércio - 224-0600 3 Núcleo DST/Aids - UFG - 202-3657

Sociedade OÁSIS (Anápolis-GO) - 313-3222

Coordenação Municipal DST/Aids

🖰 Núcleo DST/Aids - UFG - 202-3657

TEUNE NORE determent teste de elde

0000000000000000000 Aelidsaeto (am ans (elinda) Wes tan tretemento

Quem deve fazer o teste do HIV?

Toda e qualquer pessoa que teve contato sexual de risco, sexo anal, oral ou vaginal sem uso do preservativo, ou compartilhou agulhas ou instrumentos perfuro cortantes com uma outra pessoa.

Tem que ter em conta que o HIV, após contato com o corpo por via sexual ou sanguínea demora até três meses para aparecer, ou seja, o exame só detecta o vírus após a pessoa ter sido infectada neste período. Chamamos janela imunológica, o período que o organismo leva para criar anticorpos (defesas) contra o HIV.

Porque fazer o teste do HIV?

A AIDS não tem cura (ainda), por isso é importante sabermos se estamos infectados com o HIV, para que possamos iniciar o tratamento o mais rápido possível. Para se manter saudável por mais tempo e não esperar que se desenvolva a AIDS.

Para cuidar de nosso/s parceiro/s e não transmitir o vírus.

Existe vacina contra a AIDS?

Não, alguns laboratórios estão testando vacinas mas até hoje não existe uma vacina disponível a ser comercializada ou distribuída pela rede pública de saúde. Por isso a melhor vacina é a prevenção. Faça sexo protegido, use sempre camisinha !!!.



Onde fazer o teste gratuito?

O teste é muito simples. Ele pode ser feito em qualquer hospital público que disponha do serviço, ou em clínicas particulares.

COAS/DST: Rua Com. José Alves Ferreira, 240, Garcia - Fone (71) : 328-0993/0251 CTA/COAS Municipal: Largo de Roma, s/n Mares Tel: 314-8942

Hospital Couto Maia: Rua São Pedro s/n Bonfim Tel: 316-3261/3834

Hospital Roberto Santos: San Martins Tel: 372-2999, 387-3419/4425

Hospital das Clínicas: A. Viana s/n Canela Tel: 339-6000

LACEN: Rua Valdemar Falcão s/n Brotas CREAIDS: Rua Com. José Alves Ferreira, 240 Garcia Tratamento terapêutico, odontológico e Hospital-Día

Maiores informações DISK-AIDS

Ministério da Saúde: 0800 61 1997 Disk Aids/CREAIDS: (71) 321.5737

Grupo Gay da Bahia

Rua Frei Vicente, 24° Pélourinho Salvador, 8A Tel (71) 321.1848 e 322.2552 Página www.ggb.org.br - ggb@ggb.org.br



















GRUPO PELA VIDDA - São Paulo R. General Jardim, 556 CEP 01223.010 • São Paulo • SP Fone/Fax: (011) 258.7729 Caixa Postal 8350 • CEP 01065.970 Conta para doação: Banco Real S/A - Ag. 0372 c/c. 3703005







- GRUPO PELA VIDDA
- QUEM SOMOS
- NOSSO OBJETIVO
- JUNTE-SE A NÓS
- ATIVIDADES PELA VIDDA



PELA VIDDA

Grupo Pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS.

QUEM SOMOS

Portadores do HIV (o vírus da AIDS), seus amigos, familiares e interessados em geral. Somos voluntários trabalhando pela vida.

NOSSO OBJETIVO

Lutar pelos direitos civis e pela dignidade dos portadores do HIV. Queremos mostrar que a epidemia de AIDS pode ser controlada através de um esforço coletivo baseado na solidariedade.

JUNTE-SE A NÓS

Compareça às Reuniões de recepção às 2ª feiras, 19:30 hs

ATIVIDADES PELA VIDDA

- Chá Positivo (5ª feiras às 19:30 hs)
- Oficinas de Sexo Seguro
- Atendimento Jurídico
- · Aconselhamento Psicológico
- · Projeto Homens Sexo Homens
- · Cadernos Pela Vidda
- · Intervenções na Comunidade
- · Núcleo de Adolescentes
- · Núcleo de Mulheres
- · Acompanhamento das Políticas de Saúde

Relações sexuais com camisinha





A convivência não transmite o HIV/Aids.

Abraços, beijos e apertos de mão só transmitem solidariedade.



aperto de mão, tosse, espirro, mosquito, copo, vaso sanitário, alimentos, banco de ônibus, piscina, chimarrão, roupa e a doação de sangue não passam o vírus HIV/Aids. Ele só é transmitido através do sangue, esperma, secreção vaginal ou leite materno contaminados.

Exame de HIV/Aids no pré-natal.

O seu primeiro carinho de mãe.

Proteja o seu bebê do vírus da Aids.

Durante a gestação, faça o pré-natal e exija o teste.



Está com uma pulga atrás da orelha?

Faça o teste do HIV/Aids.

Se você teve uma relação sexual vaginal, anal ou oral sem camisinha ou compartilhou seringas e agulhas, faça o teste do HIV/Aids.

Ele **é de graça** e acaba com suas dúvidas.

Conheça nossa programação para a comunidade:

Programa de auto ajuda

Relaxamento e convivência, coordenados por um psicológo.

Atendimento jurídico

Assistência jurídica gratuita as pessoas que vivem com HIV/Aids

Reiki

Terapia complementar, que busca restabelecer o equilibrio energético.

Nutricão

Dicas e programas de nutrição para controle do peso e saúde.

Atendimento psicológico Através de hora marcada

Video Aids

Programa permanente de informação/prevenção dirigidos a entidades e instituições.

Grupo de adesão ao tratamento

Trata das questões cotidianas das pessoas que vivem com HIV/Aids.

Encaminhamento social Quartas-feiras, 9h30min

FIQUE VIVO! Grupo de Trabalho

Terapia ocupacional e geração de renda. Prestação de serviços a microempresas que queiram terceirizar atividades.



Tel: (51) 341-6333 – ramal 212: Rua 3 de abril, 90 – área II Centro de Saúde IAPI (Postão) Porto Alegre/RS

rcomvida@brhs.com.br

De segunda a sexta-feira Das 14 às 17h30min

29

Informação e solidariedade. É assim que a **Rede Compromisso** a Vida qualidade traz mai de vida para você.

Como se proteger da AIDS e DST's

Faça sexo sempre com camisinha!
Não importa como, nem onde, nem
com quem, muito menos por quanto.
Utilize somente agulhas e seringas
descartáveis nas aplicações de
drogas, hormônios ou silicone.
Quem for HIV positivo ou doente
por consequência da Aids não deve
nunca ter relações sem camisinha,
não só para evitar transmitir a
doença como também para
proteger-se de um aumento da
quantidade de vírus.

Quem Batalha se Cuida

Pergunte Aids 0800-61 24 37 ligue grátis



Grupo Astral

Projeto Casa Viva End.: Rua Frei Caneca, 139 - Centro Rio de Janeiro, RJ CEP 20211-010 Fone: (021) 232-2181

Financiamento Coordenação Nacional de DST/AIDS-MS





. . . Previna-se de alguns, usando sempre a camisinha. Afinal, trata-se da sua vida!

Se você depende do seu corpo para sobreviver, precisa cuidar dele como cuida da sua vida. Proteja-se das doenças que são transmitidas durante as relações sexuais. A maioria tem cura quando tratada, outras são tão poderosas que podem prejudicar sua aparência e sua saúde.

Se você, às vezes, arriscase fazendo "programas" sem proteção, apenas por uns "trocados" a mais, lembre-se: não há dinheiro no mundo que pague uma vida!

Você não pega Aids fazendo avenida, pega por não usar camisinha.
Os cuidados de proteção contra estas doenças não devem ocorrer só na hora do sexo, mas sempre que se estiver em contato com seringas, agulhas e sangue.

Para quem não sabe sobre os riscos que se corre e como evitá-los, relacionaremos algumas das doenças mais conhecidas e como prevenirse delas.

A camisinha é a sua segurança, use sempre.



Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

É provocada por um vírus chamado hiv, que pode ser encontrado no sangue, na baba que sai antes da ejaculação, no esperma, na secreção da vagina e no leite da mãe. Este vírus reduz o número de glóbulos brancos do corpo, enfraquecendo as defesas contra outras doenças.

Como se pode pegar Aids

Fazendo sexo oral, anal ou vaginal sem camisinha
Recebendo sangue contaminado nas transfusões
Utilizando com outras pessoas a mesma agulha ou seringa na aplicação de drogas, hormônios ou silicone.

DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis)

São transmitidas nas relações sexuais com pessoas contaminadas. Algumas delas nem se percebe no início, mas com o tempo se manifestam de forma grave.

As visitas ao médico periodicamente são muito importantes, principalmente para quem precisa se relacionar sexualmente com várias pessoas diariamente.

Não tome remédios caseiros ou sem receita médica, pois a doença poderá se agravar tornando a sua cura mais demorada. Procure sempre um Posto de Saúde. Gonorréia (Esquentamento, corredeira)

- você só pega esta doença através das
relações sexuais sem camisinha. Seus
sintomas são saída de pus pelo pênis e
dificuldade para urinar.

Sífilis - inicia com ferida no pênis, boca ou ânus, que desaparece em uma semana mesmo sem tratamento.

Quando não tratada, a doença se instala no sangue e pode ter outras complicações. Tomar benzetacil sem receita médica pode esconder a doenca.

Cancro mole (cavalo) - inicia-se sob forma de feridas no pênis e no ânus, que com o tempo tornam-se maiores e mais dolorosas.

Herpes genital - são pequenas bolhas que aparecem nos órgãos genitais, ardem e coçam.

Condiloma (crista de galo) - inicia-se com pequenas verrugas na ponta do pénis ou no ânus. Quando não tratadas se multiplicam podendo até formar tumores.



SAOO

(Centro de Orientação e Apoio Sorológico)

*Goiânia - Centro de Saúde Juarez Barbosa sala 57, Rua 4 esq. c/ Av. Tocantins, Centro Tel.: 225-8792.

*Rio Verde - CAIS - Rua Goiânia, 1.032, Centro Tel.: (062) 621-3963.


*Anápolis - Ambulatório Geral do SUS
Anápolis - Ambulatório Geral do SUS
Av. São Francisco, 810, Jundiai - Tel.: 324-8612.

*Itumbiara - Rua Aurélio Alves dos Santos, s/n Bairro Alto Boa Vista - Tel.: 431-8767.

DISONE VIDS: (095) 550-1414









ADS

PREVINA-SE

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS ou SIDA), é uma doença causada por um vírus, o HIV, que ataca as células responsáveis pela defesa de nosso corpo. A AIDS ainda não tem cura, sendo a prevenção o melhor remédio.

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO

- * Transfusão com sangue contaminado.
- * Relações sexuais: através do esperma ou secreções vaginais.
- * De mãe para filho: durante a gravidez, parto ou amamentação, se a mãe estiver contaminada.
- * Uso de agulhas e seringas contaminadas.

O HIV pode ser transmitido por qualquer pessoa, desde que ela esteja contaminada. Não importa idade, sexo, cor ou raça.

ALERTA:

- * Reduza o número de parceiros (as) sexuais.
- * Agulhas e seringas só descartáveis.
- * Exija sangue testado nas transfusões de sangue.
- * Use sempre camisinha em todas as relações sexuais.

IMPORTANTE

Uma pessoa contaminada com o vírus pode não ter nenhum sintoma durante anos. Mas mesmo assim, pode transmitir o vírus para outra pessoa.

O único meio de confirmar a existência da infecção pelo vírus HIV, é através de exame laboratorial, solicitado com orientação de médico ou profissional de saúde.

BASTA DE PRECONCEITO

As pessoas com AIDS devem receber todo o apoio das empresas onde trabalham, dos colegas e dos familiares. Não tenha medo de apertar a mão, dividir assentos, piscinas, saunas, banheiros ou vasos sanitários com essas pessoas.

A melhor forma para o doente enfrentar o vírus da AIDS é a solidariedade. Se você souber de alguém que esteja com AIDS, contribua para que seu astral seja elevado.

DISCUTA O ASSUNTO COM SUA FAMÍLIA. A AIDS, AINDA NÃO TEM CURA! SERINGAS SÓ DESCARTÁVEIS. SEXO SÓ COM CAMISINHA.

A PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO!

Centro de Centro Anônima Testagem Anônima

Serviços Auxiliares

DISQUE SAÚDE: 1520 DISQUE AIDS: 220-1414 GRUPO PELA VIDA: 212-5319 AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA DE DST/AIDS: 8241665



Secretaria Municipal de Saúde



O que é?

Objetivos?

Como funciona?

O QUE É?

É um Centro de Testagem Anônima - CTA, implementado nos estados pelo Programa Nacional do DST / AIDS, do Ministério da Saúde, como estratégia nacional para realização de testes voluntários, gratuítos, sigilosos e anônimos. Oferece aconselhamento e diagnóstico, sorológico da infecção pelo HIV (vírus de imunodeficiência humana).

Objetivos:

- Contribuir para redução de risco de contrair a infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
- Ampliar o acesso da população ao diagnóstico da infecção.
- Absorver a demanda de testagem comumente direcionada para os bancos de sangue.
- Estimular adoção ou a continuidade de comportamente e prática sem risco.
- Facilitar a busca de serviços clínicos para os soros soropositivos.

Como Funciona:

Há uma rotina de aconselhamento coletivo (reunião), com horários pré-estabelecidos, onde a pessoa recebe todas as orientações inerentres ao serviço/diagnóstico. Não há necessidade de solicitação (pedido médico e nem estar de jejum. Basta a vontade de saber se entrou em contato com o vírus. Os resultados são comunicados, posteriormete, de forma individual, mediante apresentação de um cartão senha, entregue quando da coleta do sangue.

Horários das reuniões pré-testes 7:30 hs menos 4° feira 9:00 hs menos 4° feira 12:30 hs de 2° à 6° feira 14:00 hs de 2° à 6 feira